

Übungsblatt 8

22.11.2023

Selbstlernaufgaben

Aufgabe 1

Verifizieren Sie, dass die Menge \mathbb{R}^+ aller echt positiven reellen Zahlen mit den Verknüpfungen $x \oplus y := xy$ und $\lambda \odot x := x^\lambda$, $x, y > 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$, ein reeller Vektorraum ist.

Aufgabe 2

Gegeben sind zwei Vektoren $a, b \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Sind U_1, U_2 Untervektorräume des \mathbb{R}^3 ?

(a) $U_1 = \{x; x \in \mathbb{R}^3, \det(a, b, x) = 0\}$

(b) $U_2 = \{x; x \in \mathbb{R}^3, \det(a, b, x) = 1\}$

Aufgabe 3

Untersuchen Sie, ob die Menge $S_{a,b}$ mit fest vorgegebenen $a, b \in \mathbb{R}_{>0}^n$

$$S_{a,b} := \{\alpha a + \beta b \mid \alpha \geq 0, \beta \geq 0\}$$

der Linearkombinationen mit nicht-negativen Vorfaktoren einen Untervektorraum des \mathbb{R}^n bildet.

Fertigen Sie auch eine Skizze an, die das Ergebnis verdeutlicht, indem Sie (nur für die Skizze) Beispielvektoren für a und b aus dem \mathbb{R}^2 wählen.

Aufgabe 4

Bilden Sie eine Gruppe aus nur zwei Elementen 0 und 1. Dabei soll 0 das neutrale Element sein. Welche Ergebnisse müssen die 4 Operationen

$$0 \circ 0$$

$$0 \circ 1$$

$$1 \circ 0$$

$$1 \circ 1$$

haben? Begründen Sie die Ergebnisse mit den Gruppenaxiomen.

Hausaufgaben

Aufgabe 5

Zeigen Sie, dass die folgenden Mengen keine Vektorräume über \mathbb{R} bilden.

$$(a) V = \mathbb{R}^3 \text{ mit } x + y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix} \text{ und}$$

$$\lambda x = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$(b) V = \mathbb{R}^3 \text{ mit } x + y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix} \text{ und}$$

$$\lambda x = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) V = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq 0\} \text{ mit der Addition und skalaren Multiplikation des } \mathbb{R}^n.$$

Aufgabe 6

Überprüfen Sie, welche der folgenden Mengen Untervektorräume sind:

$$(a) W_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 = y\}$$

$$(b) W_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_4 = x_2\}$$

$$(c) W_3 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 = 0\}$$

Aufgabe 7

Zeigen Sie, dass die Matrizen

$$A := \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \mid a_{i,j} \in \mathbb{R} \forall i = 1, 2, j = 1, 2, 3 \right\}$$

mit den Verknüpfungen $+$ und \cdot einen reellen Vektorraum bilden.